

GUÍA PRÁCTICA DE

FORMULACIÓN EN CUIDADOS PALIATIVOS

DE LA FÓRMULA MAGISTRAL AL MEDICAMENTO INDIVIDUALIZADO



Coordinadores

JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ - MARTÍN MUÑOZ MÉNDEZ



AUTORES



Abarca Lachén, Edgar

Farmacéutico Formulista. Profesor de Formulación de la Universidad San Jorge. Director Científico de LaSEMI

Carrasco Zafra, María Isabel

Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Máster en Cuidados Paliativos. ESAD de Fundación CUDECA (Málaga)

Corral García-Segura, Javier

Farmacéutico Formulista. Máster en Atención Farmacéutica. Especialista en Formulación Hospitalaria

Deblas Sandoval, Álvaro

Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Máster en Cuidados Paliativos. ESAD de Fundación CUDECA (Málaga)

Domínguez Rodríguez, José Luis

Coordinador del grupo CUDECA. Enfermero. Experto en Cuidados Paliativos y CP Pediátricos. Máster en Bioética. Equipo Soporte de Atención Domiciliaria (ESAD) de Fundación CUDECA (Málaga)

Malo Manso, Izaskun

Farmacéutica Formulista. Experta Universitaria en formulación de medicamentos individualizados. Máster en Atención Farmacéutica. Vocal de LaSEMI

Manso Salinas, Elena

Farmacéutica Formulista. Experta Universitaria en formulación de medicamentos individualizados. Vocal de LaSEMI

Muñoz Méndez, Martín

Coordinador del grupo LASEMI. Farmacéutico formulista. Profesor colaborador de la Universidad San Jorge. Vicepresidente de La Sociedad Española del Medicamento Individualizado (LaSEMI)

Nebro Gil, Alicia

Enfermera. Experta en Cuidados Paliativos. ESAD en Fundación CUDECA (Málaga)

Sánchez-Brunete Santos, José Antonio

Farmacéutico Formulista. Doctor en Farmacia. Especialista en Farmacia Industrial y Galénica

Vega Gómez, Noemí

Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Máster en Cuidados Paliativos. ESAD de Fundación CUDECA (Málaga)

SUMARIO



| | | |
|----------|--|-----|
| 1 | Generalidades | 1 |
| 2 | La disfagia y su abordaje en el paciente paliativo | 9 |
| 3 | Alteraciones de la mucosa oral y su abordaje en el paciente paliativo | 45 |
| 4 | La úlcera neoplásica y su abordaje en el paciente paliativo | 95 |
| 5 | Alteraciones dermatológicas y su abordaje en el paciente paliativo | 117 |
| 6 | Alteraciones genitourinarias y su abordaje en el paciente paliativo | 147 |
| 7 | Alteraciones anorrectales y su abordaje en el paciente paliativo | 161 |
| 8 | Otras vías de administración para el abordaje del dolor y otros síntomas en el paciente paliativo | 181 |
| | Índice de fórmulas descritas | 203 |

ÍNDICE DE FÓRMULAS



| | |
|---|-----|
| » ALPRAZOLAM 1 mg/ml jarabe | 17 |
| » ALUMBRE solución intravesical | 157 |
| » ALUMINIO CLORURO 20% solución tópica | 141 |
| » AMILORIDA 1 mg/ml solución oral | 19 |
| » AMITRIPTILINA 2,5 mg/ml jarabe | 87 |
| » ATENOLOL 2 mg/ml solución oral | 21 |
| » ATROPINA 12,5 µg/gota solución sublingual | 89 |
| » BACLOFENO 5 mg/ml jarabe | 23 |
| » CIMETIDINA 60 mg/ml jarabe | 131 |
| » Colutorio de LIDOCAÍNA 2% y NISTATINA 100.000 UI/ml | 59 |
| » Colutorio de LIDOCAÍNA 2%, HIDROCORTISONA 1,5%, NISTATINA 100.000 UI/ml y GENTAMICINA SULFATO 0,1% | 63 |
| » Colutorio de LIDOCAÍNA 2%, NISTATINA 100.000 UI/ml y CLORHEXIDINA digluconato 0,12% | 61 |
| » DEXAMETASONA 1 mg/ml jarabe | 25 |
| » DILTIAZEM 2% pomada rectal | 167 |
| » DILTIAZEM 2% y LIDOCAÍNA 2% pomada rectal | 169 |
| » DIMETILSULFÓXIDO, HEPARINA, HIDROCORTISONA y LIDOCAÍNA, solución intravesical | 155 |
| » DOXEPINA 0,5% enjuague bucal | 69 |
| » DOXEPINA 5% crema | 133 |
| » FÓRMULA ANTIEMÉTICA en gel PLO | 187 |

| | |
|---|-----|
| » GABAPENTINA 100 mg/ml suspensión oral | 27 |
| » GENTAMICINA solución tópica | 110 |
| » GLUCOSA, CHITOSAN, HIDROXIPROPILMETILCELULOSA polvo | 112 |
| » HIDROXIZINA 20 mg y RANITIDINA 150 mg cápsulas | 135 |
| » KETAMINA 6%, GABAPENTINA 6%, AMITRIPTILINA 2% y CLONIDINA 0,2% gel PLO | 185 |
| » LIDOCAÍNA 2% y ACETÓNIDO DE TRIAMCINOLONA 0,3% en excipiente adhesivo oral | 57 |
| » LIDOCAÍNA 2%, ALCANFOR 0,5% y MENTOL 0,5% emulsión | 137 |
| » LIDOCAÍNA 2%, HIDROCORTISONA 1% y DIFENHIDRAMINA 2% loción | 138 |
| » LIDOCAÍNA 2%, METRONIDAZOL 2% y ÁCIDO TRANEXÁMICO 1% gel | 106 |
| » LIDOCAÍNA 4% y PRILOCAÍNA 4% gel | 101 |
| » LIDOCAÍNA compuesta suspensión bucal | 65 |
| » LIDOCAÍNA viscosa gel | 55 |
| » LORAZEPAM 1 mg/ml suspensión oral | 29 |
| » MELATONINA 0,5% crema | 144 |
| » MESALAZINA 4% suspensión para enemas | 177 |
| » METADONA vial inyectable | 190 |
| » METILFENIDATO 1 mg/ml jarabe | 31 |
| » METRONIDAZOL gel | 104 |
| » MORFINA 0,2% enjuague bucal | 67 |
| » MORFINA gel Intraside® | 103 |
| » MORFINA vial inyectable | 192 |
| » MORFINA y BACLOFENO vial inyectable intratecal | 194 |
| » MORFINA y BUPIVACAÍNA vial inyectable intratecal | 196 |
| » MORFINA y CLONIDINA vial inyectable intratecal | 198 |

| | |
|---|-----|
| » MORFINA, BUPIVACAÍNA y CLONIDINA vial inyectable intratecal | 200 |
| » NALTREXONA 1 mg/ml suspensión oral | 33 |
| » NIFEDIPINO 0,2% pomada rectal | 173 |
| » NITROGLICERINA 0,2% y LIDOCAÍNA 1,5%, pomada rectal | 171 |
| » OMEPRAZOL 5 mg/ml suspensión oral | 35 |
| » OXIBUTININA 2% en solución | 143 |
| » OXIBUTININA solución inyectable | 154 |
| » PANTOPRAZOL 2 mg/ml suspensión oral | 38 |
| » Piruletas con PILOCARPINA 2 mg | 85 |
| » Piruletas con TETRACAÍNA 20 mg | 70 |
| » POLIDOCANOL 5% en aceite | 128 |
| » POLIDOCANOL 5%, LIDOCAÍNA 2% emulsión O/W | 129 |
| » PREDNISONA 5 mg/ml suspensión | 40 |
| » SALIVA ARTIFICIAL | 76 |
| » Saliva artificial con LIDOCAÍNA 0,5% | 78 |
| » Solución de ÁCIDO CÍTRICO 3,5% | 81 |
| » Solución oral de PILOCARPINA | 83 |
| » Spray de CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA | 80 |
| » SUCRALFATO 100 mg/ml suspensión para enemas | 175 |
| » SUCRALFATO 4% gel | 108 |
| » TRAZODONA 10 mg/ml jarabe | 42 |